VOTRE SANG FAIT LA DIFFÉRENCE

Pourquoi donner son sang?

grâce aux produits sanguins : cette évolution, qui ne s'infléchira pas, nous sanguins ont augmenté de plus de 10% et Aujourd'hui 1 million de malades est soigné invite tous à rester mobilisés et vigilants. Ces dernières années les besoins en produits

- 500000 personnes sont soignées par transfusion sanguine, par exemple
- une femme qui a perdu beaucoup de sang après son accouchement
- une personne atteinte d'un cancer et que la chimiothérapie a affaiblie.
- les personnes souffrant de drépanocytose
- coagulation ou encore l'albumine. des médicaments dérivés du sang dont certains déficits immunitaires, les facteurs de les immunoglobulines indispensables à 500000 personnes sont soignées à partir

substituer au sang humain. Il n'existe pas de traitement capable de se

pour les malades. Votre sang fait la différence, chaque don compte

Les conditions pour donner son sang

- être âgé de 18 à 70 ans (le 1^{er} don après de prélèvement), 60 ans est soumis à l'appréciation du médecin
- être muni d'une pièce d'identité,

- le médecin de prélèvement être reconnu médicalement apte au don par
- avoir un poids au moins égal à 50 kg
- date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué) êtes nouveau donneur ou si votre dernier don avoir un taux d'hémoglobine suffisant (si vous

Les 5 étapes du don de sang

- détermine si vous êtes apte au don, 2. vous vous entretenez avec un médecin qui vous êtes accueilli par une équipe médicale,
- 3.le prélèvement dure de 7 à 10 minutes et permet de prélever entre 400 et 500 ml de
- surveillance de l'équipe médicale dans l'espace 5. la durée totale de ces étapes est de l'ordre repos où une collation vous est offerte, 4. après votre don, vous restez sous

samedi 8h/13h


jeudi 8h/19h

certains délais avant de donner son sang, par exemple:

après la fin d'un traitement par antibiotiques :

Gare Lille Flandres Mairie de Lille

- de carie : 1 jour), après des soins dentaires : 7 jours (sauf soin
- après un piercing ou un tatouage : 4 mois
- après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria...): 4 mois,
- après une intervention chirurgicale: 4 mois



Dans certaines conditions il faut respecter

- après un épisode infectieux : 14 jours,

